

Date d'application :
2019-10-30**PRESCRIPTION POUR TEST AU SYNACTHENE****Version : 1**Les consignes de prélèvement sont disponibles sur le manuel de prélèvement en ligne <http://gcs-lbm3.manuelprelevement.fr>

IDENTIFICATION PATIENT	PRELEVEMENT	RENSEIGNEMENTS CLINIQUES	MEDECIN PRESCRIPTEUR :
Nom de naissance : Nom d'usage : Prénom : Date de naissance : Sexe : Service : OU ETIQUETTE	Date : Nombre de tubes :	Poids : kg Taille : cm SC : m ²	PRELEVEUR :

INDICATION :

Exploration de la fonction surrénalienne : sécrétion de glucocorticoïdes et d'androgènes

CONTRE-INDICATIONS :

Pathologie infectieuse intercurrente, Allergie/hypersensibilité au Synacthène

PRECAUTIONS PARTICULIERES :

Si possible à jeun, mais non indispensable. Surveillance 2h après l'injection

COUPLAGE POSSIBLE :

Peut-être couplé à un test au LH-RH

DEROULEMENT :**STIMULUS** : SYNACTHENE IMMEDIAT (250 µg/1ml)Posologie 250 µg/m² (maximum 250 µg) soit µg**PRELEVEMENT :****SYNPED**

	Temps (minutes)	T0	T60
	Heure effective		
	Injection du stimulus IV lente (1 min) (après prélèvements)	☐	
Systématique	Prélèvement : ACTH	☐	
	Prélèvement : Cortisol	☐	☐
Sur prescription	Prélèvement : 17 OH progestérone, delta 4 androsténone, testostérone, S-DHEA	☐	☐
Sur prescription	Prélèvement : 11 desoxycortisol (composé S)	☐	☐

En cas de couplage au test LHRH les deux tests sont faits en simultané. Doser le T0, injecter le LHRH en IV direct puis le SYNACTHENE en IV lente car risque de rash cutané. Puis rincer avec du SSI. Merci de bien vérifier que tout soit coché sur le bon et que les bons tubes soient dans la/les pochette(s)