(LBM)^3	**GCS DE BIOLOGIE MEDICALE (LBM)^3**	**R1-b-G-ENR 01**
Date d'application : 2022-01-05	**ORDRE DE PRELEVEMENT DES TUBES**	**Version : 4**

Bonnes pratiques de prélèvement (en résumé)

Ceci n'est pas un tube, c'est un patient.

- Port de gants non stériles.
- Désinfecter le site de ponction et le laisser sécher.
- Ne jamais palper le site après désinfection.
- Le garrot est utilisé pour faire saillir la veine. Ne pas excéder 1 min pour la pose du garrot.
- Choix du site de ponction : ne jamais prélever sur le bras qui est perfusé, même en cas d'arrêt momentané de la perfusion.
- Maintenir le tube en dessous du point de ponction.
- Lors du prélèvement positionner le tube, étiquette vers le bas, pour pouvoir visualiser l'arrivée du sang dans le tube.
- Veiller au bon remplissage des tubes.
- Il est recommandé d'homogénéiser le tube dès le retrait du corps de prélèvement, par plusieurs retournements lents.

- Identifier les tubes.
- Veiller à respecter les conditions recommandées de prélèvement et de transport.

Ordre de prélèvement Recommandations CLSI GP41-A7 et GFHT 2015 (www.geht.org)

Avec une aiguille (ponction franche)

Avec une unité à ailettes

BD, Le Pont de Claix, 38800, FR

bd.com/fr

Becton Dickinson France S.A.S. Société par Actions Simplifiée au capital de 62 823 000 euros. RCS Grenoble B 056 501 711 - Siret 056 501 711 00115.
© 2017 BD. BD, le logo BD et toutes les autres marques sont la propriété de Becton, Dickinson and Company. ART_029_05/17.Ab•Com.

Remarque : en cas de prélèvement sur cathéter avec bilan de coagulation (à éviter pour diminuer le risque d'hémolyse du prélèvement) : prélever après rejet d'un volume de sang tenant compte de l'espace mort que représente le cathéter (environ 5 à 10mL).